

## **Pakuotės lapelis: informacija vartotojui**

### **Furasol 100/900 mg gargalas (milteliai tirpalui)**

Furagino kalio druska / natrio chloridas

**Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Furasol galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 3 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Apie ką rašoma šiame lapelyje?**

1. Kas yra Furasol ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Furasol
3. Kaip vartoti Furasol
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Furasol
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

#### **1. Kas yra Furasol ir kam jis vartojamas**

Furasol veikioji medžiaga tirpusis furaginas (furagino kalio druska) slopina mikroorganizmų ląstelių fermentų sistemų aktyvumą bei kai kurias kitokias biochemines reakcijas, todėl suyra bakterijos ląstelės citoplazmos membrana ir apvalkalėlis. Natrio chloridas reguliuoja tirpalo osmosinį slėgį, todėl stiprina tirpiojo furagino poveikį.

Furasol vartojamas infekcijos sukeltam burnos ir ryklės uždegimo lokaliai gydymui.

#### **2. Kas žinotina prieš vartojant Furasol**

##### **Furasol vartoti draudžiama, jeigu:**

- yra padidėjęs jautrumas (alergija) furaginui ar kitiems nitrofuranų grupės junginiams;
- pacientas jaunesnis negu 4 metų.

##### **Specialios atsargumo priemonės**

Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Nesuvartotus vaisto likučius reikia išpilti.

##### **Kiti vaistai ir Furasol**

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Jokios klinikai reikšmingos sąveikos nepastebėta.

##### **Furasol vartojimas su maistu ir gėrimais**

Tirpalu reikia skalauti burną ir ryklę tarp valgymų.

##### **Nėštumas ir žindymo laikotarpis**

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Nežinoma, ar saugu vartoti šį preparatą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, kadangi tokių tyrimų neatlikta. Nėščioms moterims ir žindyvėms vaisto vartoti nerekomenduojama.

##### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

Furasol gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

### **3. Kaip vartoti Furasol**

Furasol visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

*Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 4 metų vaikams*

Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą. Maišelyje esančius miltelius reikia ištirpinti stiklinėje karšto virinto vandens ir šiltu tirpalu 2-3 kartus per dieną skalauti juo burną arba gargaliuoti. Paruoštas tirpalas yra skaidrus, geltonas. Tirpalą reikia suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima.

Jeigu manote, kad Furasol veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vartojimo būdas

Sergant burnos ertmės ligomis skalauti, o sergant ryklės ligomis – gargaliuoti apie 20-30 sekundžių, po to tirpalą išspjauti.

#### **Ką daryti pavartojus per didelę Furasol dozę**

Nitrofurano grupės dariniai yra mažai toksiški. Furasol, vartojamas pagal nurodymus, toksinio poveikio nesukelia. Apsinuodijimo šiuo preparatu atvejų nežinoma.

#### **Pamiršus pavartoti Furasol**

Jeigu praleista viena dozė, vaisto reikia vartoti toliau taip, kaip nurodyta. Gerti dvigubą dozę draudžiama. Jei būtina, reikia konsultuotis su gydytoju.

#### **Nustojus vartoti Furasol**

Po to, kai savijauta sunormalėja, vaisto reikia vartoti dar mažiausiai 2 paras. Per anksti nutraukus ar pertraukus preparato vartojimą, liga gali vėl paūmėti.

### **4. Galimas šalutinis poveikis**

Furasol, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Paprastai Furasol yra gerai toleruojamas.

Labai retai (mažiau kaip 1 iš 10 000 vartojusiųjų) pasireiškė alerginė reakcija.

#### **Pranešimas apie šalutinį poveikį**

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Pranešimą apie šalutinį poveikį galite užpildyti ir pateikti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <https://vvkt.lrv.lt/lt/> nurodytais būdais arba paskambinti nemokamu telefonu 8 800 73 568. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

### **5. Kaip laikyti Furasol**

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos. Paruoštą tirpalą suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima.

Ant paketėlio ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arbasu buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

## **6. Pakuotės turinys ir kita informacija**

### **Furasol sudėtis**

Veikliosios medžiagos yra furagino kalio druska ir natrio chloridas. Kiekviename paketėlyje yra 100 mg furagino kalio druskos ir 900 mg natrio chlorido.

Pagalbinių medžiagų nėra.

### **Furasol išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Oranžiniai rusvi, rupūs milteliai.

Kartono dėžutėje yra 5 arba 15 paketėlių, kurių kiekviename yra 1 g Furasol miltelių.

### **Registruotojas ir gamintojas**

Olpha AS,  
Rupnicu iela 5,  
Olaine, Olaines novads, LV-2114,  
Latvija

**Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2024-12-02.**

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <https://vvkt.lrv.lt/lt/>.